

FATOR XIII DE COAGULAÇÃO

Deficiência de Fator XIII

Informações gerais

Apresentação: 250 UI – pó liofilizado para solução injetável

CID-10: D68.2

Esquema terapêutico recomendado:

- Profilaxia primária ou secundária: 10 UI/kg–20 UI/kg com intervalo de 4–6 semanas.
- Episódio hemorrágico agudo: 10 UI/kg–30 UI/kg com monitoramento (pelo menos a cada 3–4 dias) para avaliar intervalo das doses, manter a dose até o sangramento ceder.
- Hemorragia intracraniana: 20 UI/kg–30 UI/kg. Monitorar e manter nível normal do Fator XIII até ceder o sangramento.
- Cirurgias: 20 UI/kg–30 UI/kg antes do procedimento e, após, monitorar para avaliar o intervalo das doses. Manter a reposição até a cicatrização.

Responsável pelo financiamento: Ministério da Saúde

Observações:

Conservar em temperatura 2° a 8°C.

Mais informações:

- [Manual de Coagulopatias Hereditárias Raras](#), publicado pelo Ministério da Saúde.

Dispensação do medicamento

A dispensação do medicamento é realizada exclusivamente a pacientes que em acompanhamento regular em um dos [Centros de Referência para Tratamento de Coagulopatias Hereditárias](#).

A SES/SP não fornece o medicamento diretamente aos pacientes.